

ノ生活狀態ハ Ranuncul 屬ノ Batrachium (ばつくわも) 節ニ似テ居リ一方じゅんちゝ屬 (Brasenia) ハりうちんくわ屬 (Caltha) ニ似テ居ル即チ葯ハ外向デアリ (うまのあしがた科ノ植物ハ殆ンド此ノ形式ヲトル) 内向葯デナク (ひつじぐち科ノ者ハ多ク此ノ形ヲナス) 子房ハ分離シ卵子ハ懸垂倒生シ、種子ニほうまのあしがた科同様胚乳ガアル等ハ明ニ此ノ科ニ近イ事ヲ示シテキルノデアアル、最後ニじゅんちゝ屬トふたじゅんちゝ屬ノ區別ヲ記セバ

ふたじゅんちゝ屬……雄藥六本、子房ハ大抵三個、水中葉ハ分裂ス

じゅんちゝ屬……雄藥十二乃至十八、子房ハ八個以上、葉ハスミテ楕形ヲナシ分裂セズ

【牧野云】 J. Lindley 氏ハ彼ノ名著 The Vegetable Kingdom (1853 年第三版) ニ Cabombaceae (科中ニ Cabomba = Nectris 「なつごんちゝ屬」 Hydrophilis = Brasenia, Rontachime 「じゅんちゝ屬」) 二屬ヲ容ル) ヲ Nymphaeaceae (ひつじぐち科、科中ニ Euryale 「きにはゝ屬」 Victoria 「きほおにはゝ屬」 Nymphaea 「ひつじぐち屬」 Nuphar 「かはね屬」 Barclaya ノ五屬ヲ容ル) ト Nelumbiaceae (はす科、科中ニ Nelumbium 「はす屬」一屬ヲ容ル) トノ中間ニ置テ居リ其科ノ異名トシテ Cabombaceae, TORREY and Gray (1858). ノ正名ノ外 Cabombeae, Rich. (1808).—Podophyllaceae, § Hydrophilidae, DC. (1821)—Hydrophilidae, Schlegel. ヲ列記シテ居ル

○藓類 雜記 (六)

迷 辭 愚 奴 笹 岡 久 彦

○參考書ニ就テ

參考書ノ問合セガ相變ラズ頻繁デアルカラ茲ニ帝國植物名鑑隱花部 (明治三十七年三月發行) 所載以後ノモノヲ記シテ大方ノ參考ニ供シマス但シ三四頁以下ノモノハ總テ省略シ纏ツタモノノミヲ舉ゲマシタ

Prof. Dr. V. F. BROTHERS 氏ノ

Musci novi japonici (Övers. Finskr. Vetensk.-Societ. Förhandl., Bd. LXII. 1919-1920. Avd. A. No. 9, pp. 1-55); (Revue Bryologique, 53^e Ann. No. 1, 1926. pp. 1-5); (Ann. Bryologiei, Bd. 1, 1928, pp. 17-27). Musci novi asiatici (Revue Bryologique, 56^e Ann. Tom. II. Fasc. 1, 1929, pp. 1-16, Pl. 1.).

Dr. J. CARDOR 氏ノ

Première contribution a la flore bryologique de la Corée (Beih. Bot. Centralb. Bd. XVII. 1904, pp. 1-44). Mousses de l'île Formose (op. cit. Bd. XIX. Abt. II. Hef. 1, 1905, pp. 85-148.).

Mousses Nouvelles du Japon et de Corée (Bull. Herb. Boiss. 2^{me} Ser. Tom. VII. No. 9, 1907, pp. 709-717; op. cit. Tom. VIII. No. 5, 1908, pp. 331-336. Bull. Soc. bot. Genev. 2^{me} Ser. Vol. I. No. 3, 1909, pp. 120-132; op. cit. Vol. III. No. 7, 1911, pp. 275-294.; op. cit. Vol. IV. No. 9, 1912, pp. 378-387.).


Dr G. PARIS 氏ノ

Quelques nouvelles pleurocarpes japonaises et tonkinoises (Revue Bryologique, 31^e Ann. No. 2, 1904, pp. 56-65.; op. cit. No. 3, 1904, pp. 93-95.).

以上ノ外ニ Dr. J. THEODOR 氏ノモノアル筈ナレド所載雜誌未詳ニツキ判明次第續稿致シマセウ、尙ホ本邦内出版ニ係ルモノハ理學界第二十七卷第五號||昭和四年五月發行||第四十一頁以下ノ拙稿ヲ參照シテ戴キタイト思ヒマス

○珍藓新屬々々をかこけ

伊勢大廟聖域ノ植物調査範圍ガ従前ノ記録ヲ破リ下等隱花植物ニマデ擴メラレタコトハ誠ニ時代ニ適應シタ意



義アルコトト悦ビマス、聖域産藓類ハ當時宇治山田中學校教諭槌賀安平民(現任縣立木本中學校長)カラ調査ヲ委嘱サレ精意査定ニ從事致シマシタガ自分ノ力ノ及バザル不詳品ハ一切ヲ舉ゲテ更ニ Prof. Dr. BROTHERUS 先生ニ送り鑑定ヲ願ヒマシタ然ル處他ノ新種名ト共ニ左記ノ新屬ガ設定サレ殊ニハ自分ノ終生ノ事業タル斯類研究ノ微力ヲ認メ拙姓ヲ附セラレタコトハ實ニ欣躍ニ堪ヘヌ次第デアリマス、最近先生ノ遺稿トシテ佛國ノ Revue Bryologique 第五十六卷第一號ニ發表サレタノヲ機會トシ茲ニ圖版ニ略記ヲ添ヘ掲出スルコトト致シマス

Sasaoka japonica BROTH. gen. nov.

et sp. nov. Musci novi asiatici p. 10.

..... Nekeraceae.

雌雄異株、植物體ハ稍纖弱緻密ニ群生シ、扁平、淡綠色光澤アリ、莖ハ匍匐伸長シ褐色ノ假根ヲ具ヘ線狀體ヲ散在ス基部ニ分枝シ絲狀單一ヲナシ稍弛ク葉ヲ着ケ扁平ニシテ幅三「ミリ」アリ小枝ハ展開シ扁平長サ一五「ミリ」單一ニシテ漸尖類ヲナス、葉ハ展開シ僅ニ流レ凹シテ不整齊卵圓狀披針形漸尖頭長サ一・九「ミリ」幅〇・六「ミリ」、邊緣ノ一側ハ廣ク内曲シ先端ニ微鋸齒ヲ帶ブ、中肋ハ單一上部ニ向フニ從ヒ次第ニ弱ク遂ニ葉尖ニ終ル、細胞ハ狹線狀先端ノモノニ乳頭ヲ擴散ス基脚ノ

モノハ較、廣シ、小枝葉ハ小形ナリ、苞葉ハ直立シ基脚ヨリ鞘狀ニ長ク披針形上部ニ鋸齒ヲ具フ子囊其他ハ未知

圖版說明

一、絲狀體ノ基部(廓大) 二、植物體(縮小) 三、莖葉(廓大) 四、葉ノ先端部(廓大) 五、葉ノ中央部(廓大) 六、絲狀體ノ先端部(廓大) 七、絲狀體(廓大) 八、葉ノ基脚外部(廓大) 九、葉ノ基脚内部(廓大) *Revue Bryologique*ニ據ル

○斷枝片葉 (其四十五)

牧野富太郎

●**たうていらん** 是レハらんノ名ヲ冒セドモ固ヨリ蘭ノ類デナクごまのはぐさ科ノるりとらのを屬宿根草デ我邦デハ寧ロ珍ラシイ者デアル、明治年間ニ始メテ之レヲ採集シタノハ梅村甚太郎君其人デ同君ハ明治三十四年八月三十一日ニ丹後國竹野郡網野町ノ海岸地デ採集セラレタガ今日デハ此邊一帶ノ地デ見ラレ私ハ昨年ノ末ニ但馬ノ久美濱附近デ之レヲ探ツタ、大正十五年ニハ朝比奈泰彦博士、緒方正資並ニ久内清孝ノ三君ガ之レヲ伯耆ノ松崎海岸デ採ラレタ(本誌第六卷第三號參照)今其採集地ヲ通覽シテ見ルト東ハ丹後カラ西ハ伯耆ニ至ル日本海ニ面セル海濱地ガ其産域デアルコトガ知レル、本種ハ飯沼慾齋著『草木圖說』草部卷ノ一ニ其圖說ガ出テ居ル所ヲ以テ見レバ同時代ニ既ニ知ラレテ居ツタ事ガ首肯セラル、ガ然シ其當時ニ始メテ邦産トシテ世ニ出タモノデアラウ、ソシテ此『草木圖說』ニ在ル其圖說ガ抑モ最初ノモノデアラウト思フ、時ニ安政三年デ今カラ七十四年前デアアル、たうていらんノ名ノ起リハ別ニ同書ニハ記シテナイガ是レハ多分洞庭蘭トシテ其名ヲ雅馴ニシタモノデハナイカト思フ、洞庭ハ支那ニ在ル著名ナ湖デ能ク詩ナドニ出テ居ル名所デアアル、本品ノ葉ハ特ニ白毛ニ被ハレテ白色ヲ呈スルカラ誰レガ觀テモ頗ル奇異ニ感ズル梢ニ穗ヲ成シテ美ナル紫花ヲ綴ルカラ尙更人ノ注目ヲ惹クニ足ルノデアアル

●薄荷護謨樹

明治十年十一月三十日發行ノ『洋々社談』第三十六號ニ